




Weide- en akkerzangers in hun omgeving?



Grauwe Kiekendief
Kenniscentrum Akkervogels



graspieper



gele kwikstaart



veldleeuwerik



Henk Jan Ottens





Deze presentatie:


- Soorten en verspreiding
- Gedrag
- Er uitgelicht: veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper
- Nesten zoeken en vinden
- Habitatgebruik
- Broedsucces



Blauwborst - *Luscinia svecica*

Broedvogels
dichtheid
2013-2015


laag
hoog




Blauwborst - *Luscinia svecica*

Broedvogels
dichtheid
2013-2015

laag
hoog



Blauwborst
broedvogeltrend - Friesland




© NEM (Sovon, RWS, CBS, provinces)

Broeden en dichtheid

Friesland 1800-2370 broedparen

Blauwborst (n=8)



Soort


blauwborst

Broedparen/100ha Friesland (agrarisch gebied)

1,1



Geelgors - *Emberiza citrinella*
Broedvogels
dichtheid
2013-2015

laag
hoog




Geelgors - *Emberiza citrinella*
Broedvogels
dichtheid
2013-2015

laag
hoog



Broeden en dichtheid

Friesland 835-1060 broedparen



Soort


geelgors

Broedparen/100ha Friesland (agrarisch gebied)

0,1




Wilde Eend - *Anas platyrhynchos*
Broedvogels
dichtheid
2013-2015

laag
hoog




Wilde Eend - *Anas platyrhynchos*
Broedvogels
dichtheid
2013-2015

laag
hoog



Broeden en dichtheid

Friesland 28.000-44.000 broedparen



Soort


wilde_eend

Broedparen/100ha Friesland (agrarisch gebied)

8,5



Rietgors - *Emberiza schoeniclus*
Broedvogels
dichtheid
2013-2015

laag
hoog




Rietgors - *Emberiza schoeniclus*
Broedvogels
dichtheid
2013-2015

laag
hoog



Broeden en dichtheid

Friesland 12.500-23.500 broedparen



Soort

rietgors


Broedparen/100ha Friesland (agrarisch gebied)

1,4

Grasmus - Curruca communis

Broedvogels
dichtheid
2013-2015



laag
hoog



Grasmus - Curruca communis


Broedvogels
dichtheid
2013-2015

laag
hoog



Broeden en dichtheid

Friesland 10.500-18.000 broedparen



Soort


grasmus

Broedparen/100ha Friesland (agrarisch gebied)

0,6



Wulp - *Numenius arquata*
 Broedvogels
 dichtheid
 2013-2015

laag
 hoog





Wulp - *Numenius arquata*
 Broedvogels
 dichtheid
 2013-2015

laag
 hoog



Broeden en dichtheid

Friesland 390-490 broedparen




Soort

wulp


Broedparen/100ha Friesland (agrarisch gebied)

0,2






Uitkomstsucces omrasterd 2023



→ 151 jongen

Uitkomstsucces niet omrasterd 2023



→ 44 jongen





Pauze






Er uitgelicht: veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper




Akker- of weidevogels?






Veldleeuwerik

broedvogeltrend - Friesland



Gele Kwikstaart

broedvogeltrend - Friesland








Nesten zoeken, nesten vinden



- Territorium/zang, conflict buurvogels,.....?
- Alarm
- Vogel met voer. Nest met jongen
- Invalplek naar nest.
- Vogel gepaard
- Man jaagt andere vogels (zelfs hazen) weg
- Man alert. Volgt vrouwtje
- Vogels blijven rond je hangen. Gaan niet weg
- Heimelijk contactroepjes
- Uitgelopen jongen
- Nestbouw
- Nest met eieren




Graspieper (n=116)



- Territorium/zang, conflict buurvogels,.....?
- Alarm
- Invalplek naar nest.
- Vogel gepaard
- Man alert. Volgt vrouwtje
- Vogels blijven rond je hangen. Gaan niet weg
- Heimelijk contactroepjes

Gele Kwikstaart





Alarm




Alert



Vrouwkje

Gepaard





- Heimelijk contactroepjes
- Uitgelopen jongen
- Nestbouw
- Nest met eieren









Habitatgebruik



- voor het eerst GPS-tracking data van een zangvogel...

Geloggerde veldleeuweriken in 2022





Nestlocaties N50 en N34 en
foerageervluchten daarvandaan




Geholpen door onze onmisbare vrijwilligers werden
voedselvluchten van oudervogels gevolgd en
foerageervluchten van wel **800 meter** geobserveerd.





Voedselbeschikbaarheid



Broedsucces

Opgave voor de graspieper, gele kwikstaart
en veldleeuwerik is helder



30-35 dagen rust


vliegvlug
jong

eileg






Gemiddelde maaidatum 1^e snede grasland




% akkers dat per vijfdaagse periode in productie komt





Broedsucces veldleeuwerik & graspieper







2020-06-11 01:21:07

M




12°C



HYPERFIRE 2 COVERT

RECONYX

Het ideale landschap voor graspieper, gele kwikstaart en Veldleeuwerik



- groot aandeel natuurlijk grasland, luzerne, granen (hoe meer hoe beter)
- ...met extensief beheer (eerste maaidatum na 1 juni, > 6 weken tussen maaibeurten)
- maatregelen zoals akkerranden, bloemblokken en keverbanken van belang voor voedsel en in combinatie met extensieve teelten.
- Extensieve teeltwijzen akkerbouw (granen, graszaad, mengteelten)

